

Ciclosporine

Néoral®

Présentation

Capsules molles de 10, 25, 50 ou 100 mg.

Comment et quand prendre mon médicament ?

Modalités de prise :

2 fois par jour, **pendant ou en dehors des repas**, à 12 heures d'intervalle. Quand vous avez choisi la manière de les prendre, veillez à ne pas changer. Les capsules peuvent être avalées intactes ou mâchées avec un grand verre d'eau.



Mes heures de prises sont :

Matin: Soir:

À adapter selon vos heures de repas.

Que dois je faire si j'oublie de prendre mon traitement ?

Si vous vous en rendez compte dans les **6 heures** suivant votre prise habituelle, prenez-le. Dans le cas contraire, sautez la prise oubliée. Ne doublez pas la dose à la prise suivante.

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament?

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de la liste des effets indésirables. Il est possible que vous n'en ressentiez aucun.

- ✓ **Anomalies de la fonction rénale:** Insuffisance rénale, néphrotoxicité.
- ✓ **Troubles digestifs:** nausée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale.
- ✓ Possible augmentation de la bilirubinémie, des phosphates alcalines et gamma GT, des lipides sanguins.
- ✓ **Trouble cutané:** Hyperpilosité = Pousse excessive de poils. Sensation de brûlure des pieds et des mains, hypomagnésémie.
- Hypertension artérielle, œdèmes.
- Tremblement des extrémités.
- Hypertrophie gingivale avec risque de saignements des gencives.

+++ **Ce qu'il faut retenir** +++

Prendre **régulièrement** son traitement est indispensable sinon les risques de rejet sont important. Une prise supplémentaire peut augmenter les risques de toxicité.

Signalez que vous prenez de la ciclosporine à tous les médecins que vous consultez.

Quelles sont les interactions possibles avec mon traitement?

Certains médicaments et aliments (Jus de pamplemousse et Millepertuis) peuvent **augmenter ou diminuer** l'action de la ciclosporine (Néoral®).
Ce sont des interactions.

- ✓ **L'automédication** n'est pas conseillée.
- Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre des médicaments hors prescription.
- ✓ **Ne prenez pas de jus de Pamplemousse** (augmentation des taux sanguins de Ciclosporine) ni de millepertuis (diminution des taux sanguins de Ciclosporine) pendant votre traitement

Quelles sont les mises en garde avec mon traitement?

- ✓ Vous pouvez être plus sensible aux infections.
- ✓ Vous devez vous protéger de l'exposition aux UV. (il est déconseillé de s'exposer au soleil de façon prolongée)

A quoi sert mon médicament ?

- ✓ La ciclosporine a pour nom de spécialité pharmaceutique Néoral®.
- ✓ C'est un **immunosuppresseur** indiqué pour la prévention du rejet de greffe. Il est associé à d'autres médicaments immunosuppresseurs.

Il est utilisé pour empêcher votre organisme de rejeter l'organe qui vous a été transplanté.

Le suivi pharmacologique de mon traitement

Un suivi des concentrations de ciclosporine dans le sang est nécessaire pour adapter votre prescription. Le dosage de médicament peut être réalisé 2h (T2H) après la prise ou 12h après la prise soit le matin juste avant la prise d'une nouvelle dose (To)

Le suivi biologique de mon traitement

Un contrôle de la créatinine et de la tension artérielle doit être régulier.

Comment conserver mon médicament ?

Conservez les capsules molles entre 15°C et 30°C.

Hôpitaux
universitaires
Paris-Sud
Antoine-Béclière Bicêtre Paul-Brousse

HOPITAL PAUL BROUSSE
Centre Hépato-Biliaire

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

- la coordination transplantation du CHB:

Tél: 01 45 59 64 22
entre 9h et 19h la semaine

Si vous n'arrivez pas à joindre la coordination:

- un pharmacien de l'hôpital :

Tél: 01 45 59 32 14

- votre médecin traitant

Pharmacie et CHB
Hôpital Paul Brousse

12, avenue Paul-Vaillant Couturier
94800 Villejuif

Février 2013

Ciclosporine NEORAL®

Fiche d'information aux patients transplantés hépatiques

du Centre Hépato Biliaire (CHB)
de l'Hôpital Paul Brousse (Villejuif)

*Ce fascicule est destiné à vous
aider à répondre à vos
éventuelles questions.*

